

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 21.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTERIUM

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

- A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
- A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
- **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
- Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

Tartalmi kérések:

- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
- Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
- Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **csak egy** (a magasabb pontszámú) **értékelhető**.
- A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
- Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
- **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

I.

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. | | |
| $q = 2$ | 2 pont | |
| Összesen: | 2 pont | |

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 2. | | |
| A: hamis | 1 pont | . |
| B: igaz | 1 pont | |
| C: hamis | 1 pont | |
| Összesen: | 3 pont | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| 3. | | |
| $\lg x = \lg(3 \cdot 25)$ | 1 pont | <i>A végeredmény helyes felírása esetén is jár a 2 pont.</i> |
| $x = 75$ | 1 pont | |
| Összesen: | 2 pont | |

| | | |
|---|---------------|---|
| 4. | | |
| $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$ féle szám képezhető. | 2 pont | <i>Ha 27 a válasz, 1 pont adható.</i> |
| Összesen: | 2 pont | <i>Az összes eset felsorolásakor is jár a 2 pont.</i> |

| | | |
|--|---------------|--|
| 5. | | |
| Anna $\frac{1}{5}$ valószínűséggel lép be elsőnek. | 2 pont | |
| Összesen: | 2 pont | |

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 6. | | |
| A: igaz | 1 pont | |
| B: hamis | 1 pont | |
| C: igaz | 1 pont | |
| Összesen: | 3 pont | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 7. | | |
| $x^2 - 9 \neq 0$ | 1 pont | |
| Nem értelmezhető $x = 3$, vagy $x = -3$ esetén. | 1 pont | <i>Az $x \neq \pm 3$ felírására is jár az 1 pont. Ha csak az egyik értéket tünteti fel, nem jár pont.</i> |
| Összesen: | 2 pont | |

| | | |
|------------------|--------|---|
| 8. | | |
| | 2 pont | <i>Ha hibás az ábra, de van legalább három jó fokszámú pont, 1 pont adható.</i> |
| Összesen: | | 2 pont |

| | | |
|-------------------------------|--------|---------------|
| 9. | | |
| A keresett betűjel: b) | 2 pont | |
| Összesen: | | 2 pont |


| | | |
|--|--------|---------------|
| 10. | | |
| $\vec{AF} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$ | 2 pont | |
| Összesen: | | 2 pont |

| | | |
|--|--------|---|
| 11. | | |
| Ha x Ft a farmer eredeti ára, akkor $1,2 \cdot 0,75 \cdot x = 3600$ | 3 pont | <i>Az indoklás visszafelé való következtetéssel is megadható.</i> |
| $x = 4000$ Ft | 1 pont | |
| Összesen: | | 4 pont |

| | | |
|---|--------|---|
| 12. | | |
| $A = \{1; 2; 5; 7;\}, B = \{1; 2; 3; 4; 6;\}$ | 4 pont | <i>Ha Venn-diagrammal ábrázolja helyesen a két halmazt, akkor is jár a 4 pont. Ha csak a metszetet ábrázolta helyesen, 1 pont, az $A \setminus B$ helyes berajzolása 2 pont.</i> |
| Összesen: | | 4 pont |

II./A

13.



a)

| | | |
|--|---------------|---|
| Helyesen értelmezi és jól érvényesíti a normálparabola két eltolását: 1-1 pont, a parabola alakja „megfelelő” (nincs töréspont; a meredekség illetve annak változása jó): 2 pont | 4 pont | <i>Ha pontonként ábrázol: jó helyre került a tengelypont: 1 pont, legalább négy további pont szerepel: 2 pont, jó a grafikon: 1 pont.</i> |
| Összesen: | 4 pont | |

b)

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Jól felrajzolja az egyenest. | 2 pont | |
| Összesen: | 2 pont | |

c)

| | | |
|---|---------------|--|
| <u>Algebrai megoldás:</u> | | |
| $(x + 1)^2 - 2 + x + 1 \leq 0$ | 1 pont | |
| $x^2 + 3x \leq 0$ | 1 pont | |
| Az egyenlőség teljesül, ha $x_1 = -3$, illetve $x_2 = 0$, | 2 pont | |
| tehát a megoldás: $-3 \leq x \leq 0$. | 2 pont | |
| Összesen: | 6 pont | |


| | | |
|---|---------------|--|
| <u>Grafikus megoldás:</u> | | |
| A két grafikon a $(-3; 2)$ pontban és a $(0; -1)$ pontban metszi egymást, | 3 pont | |
| a metszéspontok között az egyenes a parabola fölött van, ezért a megoldás: $-3 \leq x \leq 0$. | 3 pont | <i>Helyes megoldás esetén akkor is járnak a pontok, ha az indoklást nem fogalmazza meg a tanuló részletesen.</i> |
| Összesen: | 6 pont | . |

| | | |
|--|---------------|--|
| 14. a) | | |
| <u>A négyzet alapú doboznál:</u> | | |
| $T_{\text{alap}} = 64 \text{ cm}^2$, | 1 pont | |
| $T_{\text{oldal}} = 128 \text{ cm}^2$. | 1 pont | |
| Az anyagszükséglet $1,1 \cdot 192 = 211,2 \text{ cm}^2$ papír, | 1 pont | |
| illetve $1,1 \cdot 64 = 70,4 \text{ cm}^2$ fólia. | 1 pont | |
| <u>A téglalap alapú doboznál:</u> | | |
| $T_{\text{alap}} = 64 \text{ cm}^2$, | 1 pont | |
| $T_{\text{oldal}} = (32 + 8) \cdot 4 = 160 \text{ cm}^2$. | 1 pont | |
| Az anyagszükséglet: $1,1 \cdot 224 = 246,4 \text{ cm}^2$ papír és $70,4 \text{ cm}^2$ fólia. | 2 pont | |
| Összesen: | 8 pont | |
| 14. b) | | |
| A doboz térfogata $8 \cdot 8 \cdot 4 = 256 \text{ cm}^3$. | 1 pont | |
| a négy golyó térfogata együtt $4 \cdot \frac{4 \cdot 2^3 \cdot \pi}{3} \approx 134 \text{ cm}^3$. | 1 pont | |
| $256 - 134 = 122$ A keresett arány: $\frac{122}{256} \cdot 100 = 47,66 \approx 48\%$. | 2 pont | |
| Összesen: | 4 pont | |

| | | |
|--|--------|--|
| 15. a) | | |
| Az összeadott páratlan számok egy $d = 2$ differenciájú számtani sorozat szomszédos tagjai. | 1 pont | |
| Legyen az összeg legkisebb tagja a_1 , ekkor $a_{55} = a_1 + 54 \cdot 2$. | 1 pont | |
| A számtani sorozat első n elemének összegére vonatkozó képletet alkalmazva: $S_{55} = 55 \cdot \frac{2a_1 + 54 \cdot 2}{2} \Rightarrow 3905 = 55(a_1 + 54)$. | 2 pont | |
| $a_1 = 17$, | 1 pont | |
| $a_{55} = 125$. | 1 pont | |

| | | |
|---|---------------|--|
| Tehát a keresett páratlan számok a 17 és a 125. | 1 pont | |
| Ellenőrzés: az összeg valóban 3905. | 1 pont | |
| Összesen: | 8 pont | |
| 15. b) | | |
| A keresett számnak 5-re kell végződnie. | 1 pont | |
| A 17 után a legkisebb ilyen szám a 25, de ez nem felel meg. | 1 pont | |
| A következő szám 35, és ez jó, mert $35 = 5 \cdot 7$. | 1 pont | |
| Tehát a keresett szám a 35. | 1 pont | |
| Összesen: | 4 pont | |

II./B

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|---|---|---|----------------|---|----|----|---|---|--------|--|
| 16. a) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha x tanuló írt közepes dolgozatot, akkor az átlag: $\frac{5 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + x \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1}{20 + x}$ | 2 pont | | | | | | | | | | | | | |
| $3,410 < \frac{5 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + x \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1}{20 + x} < 3,420$ | 2 pont | | | | | | | | | | | | | |
| $68,2 + 3,41x < 73 + 3x < 68,4 + 3,42x$ (mert $20 + x$ pozitív), az első egyenlőtlenségből: $x < 11,7$. | 2 pont | | | | | | | | | | | | | |
| A második egyenlőtlenségből $10,95 < x$, | 2 pont | | | | | | | | | | | | | |
| tehát 11 tanuló írt közepes dolgozatot. | 1 pont | | | | | | | | | | | | | |
| Ellenőrzés: így az átlag; $\frac{106}{31} \approx 3,419$ | 1 pont | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: 10 pont | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. b) | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>jegyek</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>tanulók</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table> | jegyek | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | tanulók | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 pont | |
| jegyek | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| tanulók | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
|  | 3 pont | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: 4 pont | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 16. c) | | |
| Az eredeti osztályban $\frac{11}{31}$ a közepes dolgozat kiválasztásának valószínűsége | 1 pont | |
| A párhuzamos osztályban $\frac{12}{32}$ a valószínűség. | 1 pont | |
| $\frac{11}{31} < \frac{12}{32}$, tehát a párhuzamos osztályban nagyobb a közepes dolgozat kiválasztásának a valószínűsége. | 1 pont | |
| Összesen: | 3 pont | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 17. a) | | |
| | | |
| A négyzet helyes ábrázolása, | 1 pont | |
| csúspontjainak koordinátái: $A(0; 0)$, $B(1; 0)$, $C(1; 1)$ és $D(0; 1)$. | 1 pont | |
| Összesen | 2 pont | |
| 17. b) | | |
| A kör középpontja: $K\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. | 1 pont | |
| A kör sugara $\frac{\sqrt{2}}{2}$. | 2 pont | |
| A kör egyenlete: $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ | 2 pont | |
| Összesen: | 5 pont | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 17. c) | | |
| $K_{\text{négyzet}} = 4; \quad K_{\text{kör}} = 2r\pi = \sqrt{2}\pi \approx 4,44$ | 1 pont | <i>Ha közelítő értékkel számol és 4,43-ot kap, akkor is jár az 1 pont.</i> |
| $\frac{4}{4,44} \approx 0,90$ vagyis 90 %-a. | 1 pont | |
| Összesen | 2 pont | |
| 17.d) | | |
| | | |
| L rajta van az $y = 1$ és az $y = -4x + 2$ egyenesek metszéspontján. | 1 pont | |
| Így $L\left(\frac{1}{4}; 1\right)$, | 1 pont | |
| ezért $DL = \frac{1}{4}$. | 1 pont | |
| Az $AELD$ trapéz területe $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{2} \cdot 1 = \frac{3}{8} \cdot 1 = \frac{3}{8}$. | 2 pont | |
| Az $EBCL$ trapéz területe $\frac{5}{8}$. | 2 pont | |
| A két terület aránya 3:5. | 1 pont | |
| Összesen: | 8 pont | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 18. a) | | |
| $\binom{20}{5}$ -féle, | 3 pont | <i>Ha nem használja a binomiális együtthatót, hanem tört alakban írja fel a sorrendek számát, $\left(\frac{20 \cdot 19 \cdot \dots \cdot 16}{5!}\right)$ akkor is jár a 3 pont.</i> |
| 15504 jutalmazási sorrend lehetséges. | 1 pont | |
| Összesen: | 4 pont | |
| 18. b) | | |
| $20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16$, | 3 pont | |
| 1 860 480 jutalmazási sorrend lehetséges. | 1 pont | |
| Összesen: | 4 pont | |
| 18. c) | | |
| $5! = 120$ -féle kiosztás lehetséges. | 3 pont | |
| Összesen: | 3 pont | |
| 18. d) | | |
| Bármelyik helyezés elérésének a versenyen $\frac{1}{20}$ a valószínűsége, | 1 pont | |
| a három dobogós hely valamelyikének elérése $\frac{3}{20}$ valószínűségű, | 2 pont | |
| mert ezek egymást kizáró események. | 1 pont | |
| Az öt rangsorolt esemény egyikének elérése $\frac{5}{20} \left(= \frac{1}{4}\right)$ valószínűségű. | 2 pont | |
| Összesen: | 6 pont | <i>A keresett valószínűségek kombinatorikus úton való helyes meghatározásáért is járnak a megfelelő pontok.</i> |