

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 13.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA**

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- $\frac{1}{2}$ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
 - Az objektivitás mellett a **jóhiszeműséget** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
 - Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a **nem kért** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
 - A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
 - **Levezetés, indoklás nélkül** megadott pusztá végeredményért **legfeljebb** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
 - A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha **elvi hibás reakcióegyenletet** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
 - Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az **előzőekben kapott, hibás eredménnyel** számolt tovább a vizsgázó.
 - A számítási feladat levezetésénél az érettségien **trivialitásnak** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
 - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
 - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
 - keverési egyenlet alkalmazása stb.
 - Egy-egy **számítási hibáért** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
 - **Kisebb elvi hiba** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
 - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
 - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
 - hibásan rendezett reakcióegyenlet,amely nem eredményez **szembetűnően** irreális eredményt.
-

-
- **Súlyos elvi hiba** elkövetésekor a javítókulcsban **az adott feladatrésze**re adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
 - **elvileg hibás reakciók** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
 - az adatokból **becslés alapján** is **szembetűnően irreális** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.). (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (11 pont)

- a) A források (növényi hínár) időszakossága, *1 pont*
és azok változó minősége, illetve szódatartalma. *1 pont*
(Elfogadható ezek helyett: nem volt gazdaságos,
vagy
a növekvő igényeket nem elégítette ki.)
- b) Sótűrő növények összessége. *1 pont*
- c) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{C} = \text{Na}_2\text{S} + 2 \text{CO}_2$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért.)
- d) NaCl , C , H_2SO_4 , CaCO_3 *2 pont*
(2 vagy 3 helyes képlet megadása 1 pont.)
- e) Lúgos kémhatású. *1 pont*
 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ *1 pont*
- f) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = 2 \text{NaOH} + \text{CaCO}_3$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért.)

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. E
3. A
4. C
5. D
6. A
7. E
8. A
9. C
10. B
11. B
12. C

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. A
3. B
4. D
5. A
6. B
7. B
8. A
9. C

4. Táblázatos feladat (12 pont)

1. Alumínium	<i>1 pont</i>
2. Szilícium	<i>1 pont</i>
3. IV. A	
4. VI. A	
5. $3s^2 3p^1$	
6. $3s^2 3p^4$	
7. 1 db	
8. 2 db	
9. 2 db	
10. Fémrács	
11. Atomrács	
12. Molekularács	
13. Könnyűfém, passzíválódás (a 2 válasz együtt 1 pont)	
14. Félvezető	
15. Allotrópia	
16. Al_2O_3	
17. SiO_2	
18. SO_2	
19. Pl. alumínium előállítása	
20. Pl. üveggyártás	
21. Pl. konzerválás	
<i>A 3-12. és a 14-21. pontban megjelöltek közül bármely két helyes válasz megadása 1 pont.</i>	
	<i>10 pont</i>

5. Alternatív feladat (14 pont)**A) Elemző feladat**

1. Etánamid	<i>1 pont</i>
2. Szilárd	<i>1 pont</i>
3. Metil-amin (IUPAC: metánamin)	<i>1 pont</i>
4. $CH_3NH_2 + HCl = CH_3NH_3Cl$ (vagy ionos felírással)	<i>1 pont</i>
5. Metanol	<i>1 pont</i>
6. $C_nH_{2n+2}O$	<i>1 pont</i>
7. $2 CH_3OH + 2 Na = 2 CH_3ONa + H_2$ (vagy ionos felírással)	<i>1 pont</i>
8. Propanon	<i>1 pont</i>
9. Aceton (dimetil-kezon is elfogadható)	<i>1 pont</i>
10. Korlátlan elegyedés	<i>1 pont</i>
11. Ecetsav	<i>1 pont</i>
12. H-kötés	<i>1 pont</i>
13. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH = CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$ (A víz lebegyása esetén 1 pont adható.)	<i>2 pont</i>

B) Számítási feladat

a) $HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$	<i>1 pont</i>
b) $M(HNO_3) = 63 \text{ g/mol}$, $M(NaOH) = 40 \text{ g/mol}$, $M(NaNO_3) = 85 \text{ g/mol}$	<i>1 pont</i>
$m(NaOH\text{-oldat}) = 250 \text{ cm}^3 \cdot 1,26 \text{ g/cm}^3 = 315 \text{ g}$	<i>1 pont</i>
$m(NaOH) = 315 \text{ g} \cdot 0,381 = 120 \text{ g}$	<i>1 pont</i>

$n(\text{HNO}_3) = 3 \text{ mol}$	1 pont
$V(\text{HNO}_3\text{-oldat}) = 3 \text{ mol} : 3,55 \text{ mol/dm}^3 = 0,845 \text{ dm}^3 = 845 \text{ cm}^3$	1 pont
$m(\text{HNO}_3\text{-oldat}) = 315 \text{ g} \cdot 3 = 945 \text{ g}$	1 pont
$\rho = m : V = 945 \text{ g} : 845 \text{ cm}^3 = 1,12 \text{ g/cm}^3$	2 pont
c) $n(\text{NaNO}_3) = 3 \text{ mol}$	
$m(\text{NaNO}_3) = 3 \text{ mol} \cdot 85 \text{ g/mol} = 255 \text{ g}$	1 pont
$m(\text{oldat}) = 315 \text{ g} + 945 \text{ g} - 722 \text{ g} = 538 \text{ g}$	2 pont
$m(\text{víz}) = 538 \text{ g} - 255 \text{ g} = 283 \text{ g}$	1 pont
Az oldhatóság: $(255/283 =) 90,1 \text{ g NaNO}_3\text{-ot old } 100 \text{ g víz}$	1 pont

6. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) Kolloid-oldat (szuszpenzió).	1 pont
b) Keményítőt. (A keményítő nagyméretű molekulái a kolloid mérettartományba esnek, a H-kötések miatt azonban oldódnak vízben.)	2 pont
c) Formil-csoport (aldehid-csoport vagy a képlet felírása is elfogadható).	1 pont
d) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	1 pont
e) Igen, mert a konyhasó az oldatában lévő ionok miatt vezeti az elektromosságot, a szőlőcukor oldata (a semleges molekulák miatt) viszont nem.	1 pont
f) $\text{Zn} + 2 \text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ $\text{CaCO}_3 + 2 \text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	1 pont
g) Nem. Tapasztalatok megadása (mindkét ismeretlen oldódik sósavban, és egyaránt színtelen gázok keletkeznek).	1 pont
h) Egy lehetséges megoldás: a fejlődő gázokat meszes vízbe vezetve csak a CO_2 esetén tapasztalnánk zavarosodást.	1 pont

7. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) Aminosavak, a fehérjék felépítésében vesznek részt.	1 pont
b) Szén: $118 \text{ g} : 0,4068 = 48 \text{ g}$, ami 4 mol Hidrogén: $118 \text{ g} : 0,0508 = 6 \text{ g}$, ami 6 mol Oxigén: $118 \text{ g} : 0,5424 = 64 \text{ g}$, ami 4 mol A „succinid acid” képlete: $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$	1 pont
c) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ Addíció	1 pont
d) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 2 \text{ C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{ CO}_2$ (1 pont a résztvevő anyagok helyes képletéért.)	2 pont
e) $n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 2 \text{ cm}^3 \cdot 0,01 \text{ mmol/cm}^3 = 0,02 \text{ mmol}$ $n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 3/2 \cdot 0,02 = 0,03 \text{ mmol (legalább)}$ $m(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 0,03 \text{ mmol} \cdot 46 \text{ mg/mmol} = 1,38 \text{ mg (legalább)}$ Ilyen érték mellett indulna eljárás a sofőr ellen.	1 pont
	1 pont

8. Számítási feladat (15 pont)

- a) A katódon is **$14,7 \text{ dm}^3$** gáz fejlődött. **1 pont**
- b) Az elektrolízis során a HCl bontása történik
vagy az egyenlet: $2 \text{ HCl} = \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
vagy ezek helyes használata: **1 pont**
 $m(\text{HCl}) = 400 \cdot 0,146 = 58,4 \text{ g}$ **1 pont**
 $n(\text{H}_2) = n(\text{Cl}_2) = 14,7 \text{ dm}^3 : 24,5 \text{ dm}^3/\text{mol} = 0,600 \text{ mol}$ **1 pont**
Az elbontott HCl:
 $n(\text{HCl}) = 1,20 \text{ mol}$
 $m(\text{HCl}) = 1,20 \text{ mol} \cdot 36,5 \text{ g/mol} = 43,8 \text{ g}$ **1 pont**
Az elektrolízis végén:
 $m_o = 400 - 43,8 = 356,2 \text{ g}$ **1 pont**
 $m(\text{HCl}) = 58,4 - 43,8 \text{ g} = 14,6 \text{ g}$ **1 pont**
 $m/m \% = (14,6 : 356,2) \cdot 100 = 4,1$ **1 pont**
- c) $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{Cl}_{2(\text{g})} = 2 \text{ HCl}_{(\text{g})}$ (a pont akkor is jár, ha nem termokémiai
egyenletet ír a vizsgázó) **1 pont**
reakció során 107 kJ: $92,3 \text{ kJ/mol} = 1,16 \text{ mol HCl}$ képződött
0,58 mol hidrogén (klór) gázból. **1 pont**
A gázok $(0,58 : 0,6) \cdot 100 = 96,7\%$ -**át** sikerült felfogni. **1 pont**
- d) A kiindulási oldat 10,0 grammjában
 $n(\text{HCl}) = (10,0 \text{ g} \cdot 0,146) : 36,5 \text{ g/mol} = 0,04 \text{ mol}$ **1 pont**
A közömbösítéshez szükséges NaOH:
 $n(\text{NaOH}) = 0,04 \text{ mol}$ **1 pont**
pH = 13,0- ból következik, hogy a $[\text{OH}^-] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ **1 pont**
 $V(\text{oldat}) = 0,04 \text{ mol} : 0,1 \text{ mol/dm}^3 = 0,4 \text{ dm}^3$ **1 pont**