

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 27.**

## **FIZIKA**

### **EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA**

### **JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ**

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA**

---

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelölésekkel alkalmazva kell végezni.

## ELŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feldatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

## MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgának folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kiírni, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csakis a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejt ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

## HARMADIK RÉSZ

### ***Pontszámok bontására vonatkozó elvek:***

- Az útmutató dölt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dölt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

### ***Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:***

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dölt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

**Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:**

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

**Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:**

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

\*\*\*

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

## ELSŐ RÉSZ

- 1. A**
- 2. C**
- 3. A**
- 4. C**
- 5. C**
- 6. C**
- 7. A**
- 8. A**
- 9. B**
- 10. D**
- 11. B**
- 12. B**
- 13. D**
- 14. C**
- 15. B**

Helyes válaszonként **2 pont**.

**Összesen 30 pont.**

## MÁSODIK RÉSZ

*Mindhárom témában minden pontszám bontható.*

### Egyenletes körmozgás

a) Az egyenletes körmozgás általános kinematikai jellemzése:

**1 pont**

A test körpályán mozog, állandó nagyságú sebességgel.  
(Csak a teljes válasz fogadható el!)

b) Az egyenletes körmozgás kinematikai jellemzőinek megadása:

**3 pont**

Sugár, keringési idő, fordulatszám, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás megnevezése, jele, mértékegysége.  
(Mindegyik kinematikai jellemző teljes leírása fél pontot ér, az összeg felfelé kerekítendő!)

c) Az egyenletes körmozgás dinamikai feltételének megadása:

**1+1 pont**

Mozgásirányra merőleges, állandó nagyságú erő hat, mely minden pont felé mutat.

d) A centripetális erő fogalmának megadása:

**2 pont**

(Két pont akkor adható, ha a vizsgázó jelzi, hogy a centripetális erő a testre ható erők eredője, s nem egy ténylegesen ható erőről van szó.)

e) Annak megmutatása, hogy a centripetális erő az egyenletes körmozgás során nem végez munkát:

**3 pont**

f) A kúpinga mozgásának értelmezése, azaz annak felismerése, hogy a testre ható erők eredője a centripetális erő:

**3 pont**

(Helyes értelmező ábra is elfogadható.)

g) Pontszerű töltés egyenletes körmozgásának értelmezése homogén mágneses térben:

**2 pont**

Az egyenletes körmozgás csak akkor jön létre, ha a részecskét az indukcióvonalakra merőlegesen löttük be. Ekkor a részecske sebességvektorára merőleges Lorentz-erő kényszeríti a részecskét körpályára.

h) Saját példa bemutatása az égi mechanika köréből:

**1 pont**

i) A centripetális erő azonosítása a saját példán:

**1 pont**

**Összesen**

**18 pont**

## A hő és terjedése

- a) A hőtan első főtételenek ismertetése, az összefüggésben szerepelő mennyiségek bemutatása, a köztük lévő kapcsolat értelmezése: **4 pont**
- b) A hő terjedésének irányára vonatkozó termodinamikai téTEL ismertetése: **2 pont**
- c) Példa a jó és a rossz hővezetésre (hőszigetelésre): **2 pont**
- d) A hősugárzás jelenségének ismertetése: **1 pont**
- e) Az infravörös sugárzás elhelyezése a teljes elektromágneses spektrumban: **2 pont**
- f) A hősugárzás jelenségének bemutatása egy gyakorlati példán: **1 pont**
- g) A hőáramlás jelenségének ismertetése: **1 pont**
- h) Egyszerű fizikai modell bemutatása a jelenség értelmezésére: **2 pont**
- i) A hőáramlás jelenségének bemutatása egy gyakorlati példán: **1 pont**
- j) Olyan jelenség bemutatása, amelyben többféle hőterjedési forma is tetten érhető: **2 pont**

**Összesen**

**18 pont**

**Az elektromágneses indukció játékosan***a) Az indukció jelenségének ismertetése:***2 pont***b) A Lenz-törvény ismertetése:***2 pont***c) Annak megadása, hogy hogyan fékezi le a fémhenger az erős mágnesből készített golyó esését. A folyamat fő elemeinek ismertetése:***4 pont***d) Az eső golyó hengeren belüli egyenletes mozgásának indoklása:***3 pont***e) A mágnesgolyó eltérő esési sebességének magyarázata az alumínium-, illetve a rézhengerben való esés során:***2 pont***f) A golyó gyorsabb átesésének indoklása a lyukacsos falú henger esetében:***1 pont***g) Annak magyarázata, hogy a hengeren áteső, de annak falához nem érő golyó súlyát mégis érezzük:***4 pont****Összesen****18 pont****A kifejtés módjának értékelése minden téma vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:****Nyelvhelyesség:****0–1–2 pont**

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

**A szöveg egésze:****0–1–2–3 pont**

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészletek, résztémák összefüggeneik egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó téma választása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

## HARMADIK RÉSZ

*A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknek a teljes pontszám jár. Ilyen esetben tehát az adott lépés(ek)nél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.*

### 1. feladat

Adatok:  $L = 2,2 \text{ m}$ ,  $F_A = F_B = 120 \text{ N}$ ,  $F'_A = 454 \text{ N}$ ,  $F'_B = 521 \text{ N}$ ,  $g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) A deszka tömegének meghatározása:

**3 pont  
(bontható)**

$$m \cdot g = F_A + F_B, \text{ amiből } m = \frac{2 \cdot 120 \text{ N}}{g} = 24,5 \text{ kg}$$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) A gyerek tömegének meghatározása:

**3 pont  
(bontható)**

$$M \cdot g = F'_A - F_A + F'_B - F_B, \text{ amiből } M = \frac{735 \text{ N}}{g} = 75 \text{ kg}$$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) A nyomatékegyenlet helyes felírása a deszkán fekvő gyerek esetén:

**3 pont**

A gyerek tömegközéppontjának talpától vett távolságát  $l$ -el jelölve és a nyomatékegyenletet a  $B$  jelű mérlegre mint forgáspontra felírva:

$$M \cdot g \cdot l = (F'_A - F_A) \cdot L$$

(Bármilyen más helyes felírás, pl. a tömegközéppontra vagy az  $A$  jelű mérlegre vonatkozó nyomatékegyenlet is teljes pontot ér.)

A keresett távolság meghatározása a nyomatékegyenletből:

**3 pont  
(bontható)**

$$l = \frac{(F'_A - F_A) \cdot L}{M \cdot g} = \frac{334}{735} \cdot 2,2 \text{ m} = 1 \text{ m}$$

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

**Összesen: 12 pont**

## 2. feladat

Adatok:  $T = 700$  év,  $R_{\max} = 120$  CSE.

- a) A törpebolygó Naptól vett minimális távolságának meghatározása:

*7 pont  
(bontható)*

A bolygópálya fél nagytengelyének hossza Kepler III. törvényéből számítható, a bolygó keringését a Földével összefüzetve. A Nap és a Föld közötti átlagos távolság a Föld nagytengelyének fele, 1 CSE.

$$\frac{a_1^3}{a_2^3} = \frac{T_1^2}{T_2^2} \rightarrow \frac{a_1^3}{1^3} = \frac{700^2}{1^2} \rightarrow a_1 \approx 79 \text{ CSE}$$

(képlet + számítás, 3 + 1 pont)

Mivel a bolygó távolsága a Naptól naptávolban 120 CSE, valamint:

$$R_{\max} + R_{\min} = 2 \cdot a_1 \quad (1 \text{ pont}), \text{ ezért napközelben}$$

$$R_{\min} = 2 \cdot 79 - 120 = 38 \text{ CSE} \quad (\text{rendezés + számítás, } 1 + 1 \text{ pont}).$$

- b) A keresett sebességarány meghatározása:

*5 pont  
(bontható)*

Napközelben, illetve naptávolban (amikor a bolygó pályamenti sebességvektora épp merőleges a Naphoz húzott egyenesre) a következő összefüggés áll fenn:

$$R_{\max} \cdot v_{\min} = R_{\min} \cdot v_{\max} \quad (2 \text{ pont}),$$

ami a perdületmegmaradásból vagy Kepler II. törvényéből származtattható (1 pont).

(Az összefüggést nem feltétlenül kell felírni. Amennyiben a vizsgázó ennek megfelelően számol, a két pont jár. Az összefüggés eredetére járó pontot akkor kell megadni, ha Kepler törvényét vagy a perdületmegmaradást egyértelműen megemlíti a vizsgázó.)

$$\text{Ebből a sebességek aránya napközelben és naptávolban: } \frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{R_{\max}}{R_{\min}} = \frac{120}{38} = 3,2$$

(rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

**Összesen: 12 pont**

### 3. feladat

Adatok:  $V = 5 \text{ l}$ ,  $t = 27^\circ\text{C}$ ,  $h = 42 \text{ cm}$ ,  $M_{\text{éter}} = 74 \text{ g/mol}$ ,  $\rho_{\text{éter}} = 713 \text{ kg/m}^3$ ,  $\rho_{\text{víz}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ ,  
 $R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ ,  $g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ .

*A palackban létrejövő nyomásnövekedés meghatározása:*

**3 pont  
(bontható)**

$$\Delta p = \rho_{\text{víz}} \cdot g \cdot h = 4116 \text{ Pa} \quad (\text{képlet + számítás, } 2 + 1 \text{ pont}).$$

*Annak felismerése, hogy a palackban létrejövő nyomásnövekedés egyenlő a gáznemű éter parciális nyomásával:*

**2 pont**

A felismerést nem szükséges leírni; amennyiben a vizsgázó ennek megfelelően számol, a teljes pontszám jár.

*Az állapotegyenlet felírása a palackban lévő gáznemű éterre:*

**2 pont**

$$V \cdot \Delta p = \frac{m}{M} R \cdot T$$

A pont akkor jár, ha egyértelmű, hogy a vizsgázó a palackba fecskendezett éter tömegét, illetve a nyomásnövekményt használja az állapotegyenletben.

*A palackba fecskendezett éter tömegének meghatározása:*

**3 pont  
(bontható)**

$$m = 0,61 \text{ g} \quad (\text{behelyettesítés a fenti képletbe + számítás, } 1 + 2 \text{ pont}).$$

*A palackba fecskendezett éter térfogatának meghatározása:*

**2 pont  
(bontható)**

$$V_{\text{éter}} = \frac{m}{\rho_{\text{éter}}} = 0,86 \text{ cm}^3 \quad (\text{képlet + számítás, } 1 + 1 \text{ pont}).$$

**Összesen: 12 pont**

#### 4. feladat

Adatok:  $U = 10^6 \text{ V}$ ,  $\lambda_{\text{dB}} = 1,66 \cdot 10^{-14} \text{ m}$ ,  $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ,  $u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

*A hullámhossz és a lendület összefüggésének felírása:*

**1 pont**

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

*A részecske mozgási energiája, a gyorsítófeszültség, illetve a lendület közti összefüggés felírása:*

$$e \cdot U = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$$

**4 pont  
(bontható)**

Mivel a hidrogénizotóp megadott töltése  $e$ , amely töltés az elektromos térben mozog,  $E_{\text{mozg}} = e \cdot U$  (2 pont) energiára tesz szert, tehát

$$e \cdot U = \frac{p^2}{2m} \quad (2 \text{ pont}).$$

(Az utolsó képlet felírása minden magyarázat nélkül teljes pontszámot ér.)

*Az izotóp tömegének meghatározása:*

**4 pont  
(bontható)**

$$m = \frac{h^2}{\lambda^2} \cdot \frac{1}{2 \cdot e \cdot U} = 5 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad (\text{rendezés + számítás, } 2+2 \text{ pont}).$$

(Természetesen teljes értékű eljárás, ha a vizsgázó először meghatározza az izotóp sebességét, majd ezt szorozza meg a tömeggel, hogy megkapja a lendületet, és abból a hullámhosszat:

$$v = \sqrt{\frac{2e \cdot U}{m}} \rightarrow p = m \cdot v = m \cdot \sqrt{\frac{2e \cdot U}{m}} = \sqrt{2m \cdot e \cdot U} = \frac{h}{\lambda}$$

*A tömeg összehasonlítása az atomi tömegegyességgel és a válasz megadása:*

**2 pont**

Mivel a tömeg körülbelül háromszorosa az atomi tömegegyességnak, a keresett izotóp a trícium.

**Összesen: 11 pont**